

PROTOCOLO DE EMERGÊNCIAS

NÚMEROS DE EMERGÊNCIA

Tipo de Emergência	Contato / Telefone
Emergências médicas graves (convulsão, parada cardiorrespiratória, choque anafilático etc.)	SAMU – 192
Corpo de Bombeiros	193
Hospital Regional - Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (contato com residentes)	RESIDENTES
• Bruno (R2)	(47) 99104-0899
• Renata (R2)	(11) 95211-8670
• Bárbara (R1)	(48) 98852-9555

PASSO A PASSO GERAL EM CASO DE EMERGÊNCIA

1. Interrompa imediatamente o atendimento odontológico.
2. Avalie o nível de consciência e a respiração do paciente.
3. Acione ajuda (SAMU – 192) se o caso for grave.
4. Inicie suporte básico de vida até a chegada do socorro.
5. Mantenha o paciente em posição adequada conforme o tipo de emergência.
6. Monitore sinais vitais (pressão, pulso, respiração).
7. Administre oxigênio, se disponível e indicado.
8. Registre o ocorrido (horário, sintomas, procedimentos realizados).

PROTOCOLO DE ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO

1. Verificar permeabilidade das vias aéreas.
2. Utilizar máscara facial ou cateter nasal.
3. Fluxo de oxigênio:
 - ✓ Cateter nasal: 2 a 4 L/min
 - ✓ Máscara facial: 5 a 10 L/min
4. Manter até estabilização do paciente ou chegada do socorro médico.

CONVULSÃO

1. Afaste instrumentos e objetos cortantes.
2. Não introduza nada na boca do paciente.
3. Afrouxe roupas apertadas (colares, gravatas).
4. Proteja a cabeça com apoio macio.
5. Após a crise:
 - ✓ Colocar paciente em posição lateral de segurança.
 - ✓ Administre oxigênio.
 - ✓ Monitore sinais vitais.
 - ✓ Se a crise durar mais de 5 minutos, acione o SAMU (192).

QUEDA DE PRESSÃO (Lipotimia / Síncope)

1. Colocar o paciente em posição supina com pernas elevadas.
 2. Afrouxar roupas apertadas.
 3. Assegurar boa ventilação do ambiente.
 4. Aplicar compressa fria na testa e oxigênio, se disponível.
 5. Se não houver melhora em até 2 minutos, ligar para o SAMU (192).
-

INTOXICAÇÃO MEDICAMENTOSA

1. Interromper imediatamente a administração do medicamento.
 2. Verificar vias aéreas, respiração e circulação.
 3. Manter o paciente calmo e deitado.
 4. Administrar oxigênio se necessário.
 5. Anotar o nome, dose e horário do medicamento administrado.
 6. Acionar o SAMU (192) e fornecer todas as informações sobre o fármaco.
 7. Não provocar vômitos.
-

CHOQUE ANAFILÁTICO

1. Suspende imediatamente o agente causador.
 2. Chamar o SAMU (192) imediatamente.
 3. Deitar o paciente com pernas elevadas.
 4. Administrar oxigênio.
 5. Aplicar adrenalina 1:1000 – via intramuscular (IM) no vasto lateral da coxa:
 - Adultos: 0,3 a 0,5 mL
 - Crianças: 0,01 mg/kg (máx. 0,3 mL)
 6. Se necessário, repetir a cada 5-10 minutos.
 7. Monitorar sinais vitais até chegada do atendimento avançado.
-

FRATURA DE MANDÍBULA / TRAUMA FACIAL

1. Manter vias aéreas pervias.
 2. Evitar movimentar a mandíbula.
 3. Aplicar compressa fria para reduzir edema.
 4. Verificar sangramento e controlar com compressão.
 5. Evitar que o paciente fale ou mastigue.
 6. Encaminhar imediatamente ao Hospital Regional - Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial.
 7. Contato direto com os residentes do Hospital Regional:
-
- Bruno (R2) – (47) 99104-0899
 - Renata (R2) – (11) 95211-8670
 - Bárbara (R1) – (48) 98852-9555